

**ການປັບມາດຕະການກັກຕົວຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ
(ຍົກເວັ້ນຈາກ ຈຳນວນບຸກຄົນ, ເຊັ່ນວ່າການເຕົ້າໂຮມເປັນສ່ວນຕົວ,
ຖ້າສຳເລັດການສັກຢາກັນພະຍາດໂຄວິດ)**

ພະແນກ	ເບື້ອງຂັ້ນຕົ້ນຂອງການສັກວັກຊິນ (14 ມື້ຫຼັງຈາກການສັກຢາວັກຊິນເຂັ້ມທຳອິດ)	ການສຳເລັດການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ (14 ມື້ຫຼັງຈາກການສັກຢາວັກຊິນເຂັ້ມທີສອງ)
ເດືອນມິຖຸນາ ຫລັງຈາກ (ຄັ້ງທຳອິດ)	<ul style="list-style-type: none"> • ຍົກເວັ້ນຂີດຈຳກັດຂອງຈຳນວນບຸກຄົນໃນການເຕົ້າໂຮມໃນຄອບຄົວ. • ສ່ວນຫຼຸດສຳລັບການນຳໃຊ້ສະຖານທີ່ສາທາລະນະແລະແຜນການດ້ານວັດທະນະທຳຕ່າງໆ. • ໃຫ້ເຄື່ອງໝາຍສຳລັບການສັກຢາ. • ເປີດໃຫ້ມີການເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳພັກຜ່ອນຕ່າງໆເຊັ່ນ ສູນເຕົ້າໂຮມຜູ້ສູງອາຍຸ. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການກວດກາໃນລັກສະນະບຸກ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໂດຍສະເພາະແມ່ນພະຍາບານຢູ່ ຕາມໂຮງໝໍ ແລະ ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວ (ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນການ) 	<ul style="list-style-type: none"> • ການຮ້ອງເພັງ, ໄປແຼນທີ່ນຳໃຊ້ເຄື່ອງດົນຕີສາມາດເປີດໃຊ້ງານໄດ້ (ຜູ້ທີ່ສຳເລັດການສັກຢາເທົ່ານັ້ນ) • ນອກຈາກການກວດກາໃນລັກສະນະບຸກບາງຄັ້ງຄາວ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ພະຍາບານ ຢູ່ໃນໂຮງໝໍແລະສະຖານທີ່ປິ່ນປົວຕ່າງໆ. • ສາມາດພົບແພດໝໍ ຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ແລະສະຖານທີ່ປິ່ນປົວຕ່າງໆ.
ເດືອນກໍລະກົດ ຫລັງຈາກ (ຄັ້ງທີສອງ)	<ul style="list-style-type: none"> • ຍົກເລີກຂໍ້ບັງຂັບໃນການໃສ່ຜ້າປິດປາກ ປິດດັງ ຢູ່ກາງແຈ້ງ (ຍົກເວັ້ນສຳລັບເຫດການທີ່ມີການ ເຕົ້າໂຮມຂອງກຸ່ມຄົນຈຳນວນຫລາຍ) • ຍົກເວັ້ນຈາກການຈຳກັດຈຳນວນຄົນ ສຳລັບກິດຈະກຳປະຈຳທາງສາສະໜາ. • ຍົກເວັ້ນການຈຳກັດຈຳນວນຄົນ ໃນເວລາທີ່ນຳໃຊ້ສະຖານທີ່ສາທາລະນະໃນການຈັດກິດຈະກຳ ກາງແຈ້ງ. 	

		<ul style="list-style-type: none">• ຍົກເວັ້ນການຈຳກັດຈຳນວນຄົນໃນການເຕົ້າໂຮມແບບງານສ່ວນຕົວ.• ຍົກເວັ້ນການຈຳກັດຈຳນວນຄົນໃນເວລາທີ່ໃຊ້ສະຖານທີ່ສາທາລະນະກາງແຈ້ງ.• ການເຕົ້າໂຮມຂອງກຸ່ມຄົນຈຳນວນໜ້ອຍໃນເວລາທີ່ພິທີທາງສາສະໜາຕ່າງໆ (ຜູ້ທີ່ສຳເລັດການສັກຢາເທົ່ານັ້ນ)• ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການຮັບປະທານອາຫານໃນຮ້ານ, ການຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນ, ແລະການຮັບຊົມການສະແດງໃນເວລາທີ່ຈັດພິທີໃນຮົ່ມ (ຜູ້ທີ່ສຳເລັດການສັກຢາເທົ່ານັ້ນ)
--	--	--